

Ouverture d'une consultation PreP au CH d'Agen

Alors que l'épidémie du VIH se poursuit (1.8 millions de nouvelles contaminations en 2017, 6400 en France), certaines conduites sexuelles restent à haut risque infectieux, aussi bien pour le VIH que pour les IST.

La promotion de tous les outils de prévention du VIH disponibles (dépistage, préservatif, prophylaxie pré exposition PreP, traitement post exposition TPE, traitement des personnes séropositives TasP, échange de seringue) doit se poursuivre pour augmenter leur utilisation et réduire le nombre de contaminations.

Concernant la **prophylaxie préexposition (Prep)**, elle a été autorisée en 2016, et il est scientifiquement établi qu'elle est un moyen extrêmement efficace et indispensable dans la lutte contre l'infection par le VIH (Iprx Ole, Partners Prep, Proud, ANRS Ipergay). Par ailleurs, la Prep imposant le dépistage systématique tous les trois mois des IST génitales ou orales, elles peuvent être rapidement traitées

Quand ? Où ?

Tous les 2^{ème} mardi de chaque mois, de 13h30 à 15h30, sur rendez-vous avec le Dr Marion THIERRY-MIEG

Secrétariat du 6^{ème} étage, **05 53 69 70 60** pour la prise de rendez-vous

Pour qui ?

- **HSH ou personnes transgenres, répondant à au moins un des critères suivants :**
 - ✓ Rapports sexuels anaux sans préservatifs avec au moins deux partenaires sexuels différents dans les 6 derniers mois
 - ✓ Un ou plusieurs épisodes d'IST dans les 12 derniers mois (syphilis, infection à Ct ou Ng, primo-infection par l'hépatite B ou C)
 - ✓ Au moins un recours à un TPE (traitement post exposition) dans les 12 derniers mois
 - ✓ Usage de drogues psychoactives lors des rapports sexuels (chemsex)

- **Personnes ayant les pratiques suivantes :**
 - ✓ Praticien du sexe (PDS) ayant des rapports non protégés
 - ✓ Pratiques sexuelles non protégées avec un PDS (Praticien Du Sexe)
 - ✓ Usage de drogues intraveineuses avec partage de seringues
 - ✓ Personnes en situation de vulnérabilité exposées à des rapports sexuels non protégés à haut risque de transmission du VIH

Les adolescents à risque élevé d'acquisition du VIH par voie sexuelle peuvent avoir accès à la PreP¹.

En quoi cela consiste ?

Evaluation de la possibilité de la Prep lors d'une première consultation

Prise d'un médicament de manière continue ou discontinue avant les rapports sexuels à risques

Suivi de consultation trimestriel et surveillance clinique et biologique

¹ Extension d'indication formulée en décembre 2017 par l'Agence Européenne du Médicament