

TRAITEMENT  
▶▶▶ POST ◀◀◀  
EXPOSITION  
TOUTES LES  
INFORMATIONS  
DONT VOUS  
▶▶▶ AVEZ ◀◀◀  
BESOIN

Vous avez été exposé·e à un risque de transmission du virus VIH (SIDA), et/ou des hépatites. Le médecin des urgences a évalué l'importance du risque encouru selon le type d'exposition et l'existence de facteurs aggravants. En fonction de ces critères, il vous a prescrit un traitement, celui-ci ne se justifiant que pour le VIH dans de telles circonstances.

COREVIH  
Nouvelle Aquitaine

## LE SUIVI

Dans les 24 à 48 heures vous devez contacter l'équipe soignante de votre Centre Hospitalier pour être vu par un médecin référent VIH.

Les résultats de la prise de sang des urgences vous seront communiqués ultérieurement par celui-ci.

**PRENEZ RENDEZ VOUS DÈS QUE POSSIBLE**  
avec le médecin référent VIH du service de  
maladies infectieuses de votre centre hospitalier.

POUR TOUTE LA DURÉE DU SUIVI ET PAR MESURE  
DE PRUDENCE, NOUS VOUS RECOMMANDONS :



D'UTILISER UN  
PRÉSERVATIF  
LORS DES  
RAPPORTS  
SEXUELS



DE NE  
PAS FAIRE  
UN DON DU SANG,  
DE PLASMA,  
DE PLAQUETTES.



D'ÉVITER DE  
DÉBUTER UNE  
GROSSESSE  
OU D'ALLAITER

## LE TRAITEMENT POST-EXPOSITION

Il s'agit d'un médicament ayant pour but d'éviter une éventuelle contamination par le VIH. Son efficacité permet d'éviter la transmission du VIH mais elle dépend aussi fortement de la **régularité** de la prise du traitement.

### MON TRAITEMENT POST EXPOSITION

**1 comprimé par jour**  
à heure régulière **pendant**  
**28 jours** lors d'un repas,  
et éviter les traitements  
protecteurs gastriques.



1 STRIBILD®



(TENOFVIR DISOPROXIL,  
EMTRICITABINE, ELVITEGRAVIR,  
COBICISTAT)

### LES EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES MAIS PEU FRÉQUENTS

Nausées, vomissements,  
maux de tête, insomnie,  
vertiges.

**Ces effets diminuent au  
bout de quelques jours,**  
si ce n'est pas le cas,  
n'hésitez pas à joindre  
votre médecin traitant.

**Parlez-en au médecin référent  
qui assurera votre suivi, mais  
n'arrêtez en aucun cas votre  
traitement de vous-même.**

## *P* Si vous avez des vomissements

Si vous avez pris des médicaments moins d'une heure avant, ils ne seront pas absorbés :  
reprenez une dose.

## *P* Si vous avez oublié une prise

Si vous avez moins de 6 heures de retard, prenez simplement la dose oubliée dès maintenant, et la prochaine prise à l'heure habituelle.

S'il y a plus de 6 heures de retard sur l'horaire prévu, attendez la prochaine prise et ne prenez pas de double dose.

## *P* Si vous prenez un traitement associé

Si vous prenez d'autres traitements, informez votre médecin et votre pharmacien.

**COREViH**  
Nouvelle Aquitaine

Hôpital du Tondu - Groupe Hospitalier Pellegrin  
Place Amélie Raba Léon - 33076 BORDEAUX CEDEX  
Tél : 05.56.79.56.06 - Fax : 05.56.79.60.87  
corevih@chu-bordeaux.fr - www.corevih-na.fr

*Actualisation : Février 2019*