TRAITEMENT **§POST**§ **EXPOSITION** TOUTES LES INFORMATIONS DONT VOUS **AVE7** BESOIN

Vous avez été exposé·e à un risque de transmission du virus VIH (SIDA), et/ou des hépatites. Le médecin des urgences a évalué l'importance du risque encouru selon le type d'exposition et l'existence de facteurs aggravants. En fonction de ces critères, il vous a prescrit un traitement. celui-ci ne se justifiant que pour le VIH dans de telles circonstances.

COREVIH
Nouvelle Azuitnine



Dans les 24 à 46 heures vous devez contacter l'équipe soignante de <u>votre Centre Hospitalier</u> pour être vu par un médecin référent VIH.

Les résultats de la prise de sang des urgences vous seront communiqués ultérieurement par celui-ci.

PRENEZ RENDEZ VOUS DÈS QUE POSSIBLE

avec le médecin référent VIH du service de maladies infectieuses de votre centre hospitalier.

POUR TOUTE LA DURÉE DU SUIVI ET PAR MESURE DE PRUDENCE, NOUS VOUS RECOMMANDONS :







LE TRAITEMENT POST-EXPOSITION

Il s'agit d'un médicament ayant pour but d'éviter une éventuelle contamination par le VIH. Son efficacité permet d'éviter la transmission du VIH mais elle dépend aussi fortement de la **régularité de la prise du traite**ment.



1 comprimé par jour à heure régulière pendant 28 jours lors dun repas, et éviter les traitements protecteurs gastriques.



(TENOFOVIR DISOPROXIL, EMTRICITABINE, ELVITE-GRAVRIR, COBICISTAT)

LES EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES MAIS PEU FRÉQUENTS

Nausées, vomissements, maux de tête, insomnie, vertiges.

Ces effets diminuent au bout de quelques jours, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à joindre votre médecin traitant.

Parlez-en au médecin référent qui assurera votre suivi, <u>mais</u> <u>n'arrêtez en aucun cas votre</u> traitement de vous-même.

Si vous avez des vomissements

Si vous avez pris des médicaments moins d'une heure avant, ils ne seront pas absorbés : reprenez une dose.

Si vous avez oublié une prise

Si vous avez moins de 6 heures de retard, prenez simplement la dose oubliée dès maintenant, et la prochaine prise à l'heure habituelle.

S'il y a plus de 6 heures de retard sur l'horaire prévu, attendez la prochaine prise et ne prenez pas de double dose.

Si vous prenez un traitement associé

Si vous prenez d'autres traitements, informez votre médecin et votre pharmacien.

COREVIH Nouvelle Aguitaine

PRENEZ RENDEZ-VOUS DES QUE POSSIBLE AVEC LE MÉDECIN RÉFÉRENT VIH DU SERVICE DE MALADIES INFECTIEUSES DE VOTRE CENTRE HOSPITALIER.

COORDONNÉES DU SERVICE DE MALADIES INFECTIEUSES A remplir par le médecin du service des Urgences