

TRAITEMENT
▶▶▶ POST ▶▶▶
EXPOSITION
TOUTES LES
INFORMATIONS
DONT VOUS
▶▶▶ AVEZ ▶▶▶
BESOIN

Vous avez été exposé·e à un risque de transmission du virus VIH (SIDA), et/ou des hépatites. Le médecin des urgences a évalué l'importance du risque encouru selon le type d'exposition et l'existence de facteurs aggravants. En fonction de ces critères, il vous a prescrit un traitement, celui-ci ne se justifiant que pour le VIH dans de telles circonstances.

COREVIH

Nouvelle Aquitaine

LE SUIVI

Dans les 24 à 48 heures vous devez contacter l'équipe soignante de votre Centre Hospitalier pour être vu par un médecin référent VIH.

Les résultats de la prise de sang des urgences vous seront communiqués ultérieurement par celui-ci.

PRENEZ RENDEZ VOUS DÈS QUE POSSIBLE
avec le médecin référent VIH du service de
maladies infectieuses de votre centre hospitalier.

POUR TOUTE LA DURÉE DU SUIVI ET PAR MESURE
DE PRUDENCE, NOUS VOUS RECOMMANDONS :



D'UTILISER UN
PRÉSERVATIF
LORS DES
RAPPORTS
SEXUELS



DE NE
PAS FAIRE
UN DON DU SANG,
DE PLASMA,
DE PLAQUETTES.



D'ÉVITER DE
DÉBUTER UNE
GROSSESSE
OU D'ALLAITER

LE TRAITEMENT POST-EXPOSITION

Il s'agit d'un médicament ayant pour but d'éviter une éventuelle contamination par le VIH. Son efficacité permet d'éviter la transmission du VIH mais elle dépend aussi fortement de la **régularité de la prise du traitement**.

MON TRAITEMENT POST EXPOSITION

2 comprimés par jour
à heure régulière **pendant**
28 jours lors d'un repas,
et éviter les traitements
protecteurs gastriques.



1 TRUVADA générique
(TENOFIVIR DISOPROXIL,
FUMARATE, EMTRICITABINE)



1 EDURANT® (RILPIVIRINE)

LES EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES MAIS PEU FRÉQUENTS

Nausées, vomissements,
maux de tête, insomnie,
vertiges.

**Ces effets diminuent au
bout de quelques jours,**
si ce n'est pas le cas,
n'hésitez pas à joindre
votre médecin traitant.

**Parlez-en au médecin référent
qui assurera votre suivi, mais
n'arrêtez en aucun cas votre
traitement de vous-même.**

P Si vous avez des vomissements

Si vous avez pris des médicaments moins d'une heure avant, ils ne seront pas absorbés :
reprenez une dose.

P Si vous avez oublié une prise

Si vous avez moins de 6 heures de retard, prenez simplement la dose oubliée dès maintenant, et la prochaine prise à l'heure habituelle.

S'il y a plus de 6 heures de retard sur l'horaire prévu, attendez la prochaine prise et ne prenez pas de double dose.

P Si vous prenez un traitement associé

Si vous prenez d'autres traitements, informez votre médecin et votre pharmacien.

COREViH

Nouvelle Aquitaine

**PRENEZ RENDEZ-VOUS DES QUE POSSIBLE AVEC LE MÉDECIN RÉFÉRENT VIH
DU SERVICE DE MALADIES INFECTIEUSES DE VOTRE CENTRE HOSPITALIER.**

COORDONNÉES DU SERVICE DE MALADIES INFECTIEUSES

A remplir par le médecin du service des Urgences