

Aveți nevoie de mai
multă claritate cu
privire LA SĂNĂTATEA
VOASTRĂ SEXUALĂ?

Informații pentru
a vă ajuta în acest sens



Virusul Imunodeficienței Umane (VIH) este o Infecție cu Transmitere Sexuală (ITS) care atacă sistemul imunitar și slăbește corpul în fața bolilor. Când VIH intră în corp, devii seropozitiv.

Dacă virusul a intrat în corpul unei persoane și aceasta nu ia medicamente, se îmbolnăvește. Această boală se numește SIDA (Sindromul Imunodeficienței Dobândite). De cele mai multe ori, virusul este transmis în timpul unui act sexual neprotejat și/sau prin sânge.

VIH-
SIDA 

Este important să vă informați despre boală, să vă protejați și să-i protejați pe ceilalți folosind un prezervativ.



PREZERVATIVE



Utilizarea prezervativelor oferă protecție împotriva HIV și a altor ITS, precum și împotriva unei sarcini nedorite. Este recomandat să le folosiți cu fiecare partener nou până când ambii sunt testați.




Este posibil să obțineți prezervative gratuit de la asociații, centre de depistare sau farmacii.



DEPISTARE

Testarea este esențială pentru a vă cunoaște situația Dvs în legătură cu HIV. Pentru a efectua un test gratuit, mergeți la un CeGiDD, la o asociație sau la laboratoare de analize medicale (VIHTest). VIHTest este pentru persoanele care dețin asigurare de sănătate medicală, inclusiv pentru cei ce se află în situație de ședere temporară și pentru solicitanții de azil cu AME, PUMA, CMU-C.



Unele structuri oferă, de asemenea, autoteste pentru a fi efectuate de sine stătător.

În caz de expunere la risc

PrEP

Înainte



După

TPE

PrEP (profilaxia pre-expunere) este un tratament preventiv, adică se ia înainte de raportul sexual. Este recomandat când există mai mulți parteneri sau când utilizarea unui prezervativ nu este întotdeauna posibilă.

Pentru a afla mai multe, vă puteți informa la un CeGIDD, la medicul dumneavoastră sau la o asociație.

Dacă ați avut un raport sexual riscant, există un tratament de urgență numit TPE (tratament post-expunere). Durează 4 săptămâni. Pentru a beneficia de acesta, mergeți la camera de urgență a spitalului sau la un CeGIDD în maxim 48 de ore și dacă este posibil cu partenerul dvs.




TasP

Tratamentul antiretroviral dat persoanelor care trăiesc cu HIV face ca virusul să dispară din sânge. Acest lucru se numește încărcătură virală nedetectabilă.

După 6 luni de tratament și fără alte ITS-uri, transmiterea virusului este aproape imposibilă.

Dar este important să continuați tratamentul, deoarece virusul este încă prezent în corp.



ITS

Există
vaccinuri
împotriva
unor ITS:
hepatita B și
papilomavirus.

ITS-urile se transmit în timpul raporturilor sexuale, al penetrărilor vaginale, anale și al contactelor gură/sex/anus.

Dacă aveți arsuri, mâncărime sau scurgeri, consultați un profesionist în domeniul sănătății sau mergeți la un centru gratuit de informare, depistare și diagnosticare (CeGIDD).

Chiar și fără simptome, este esențial să vă faceți testul și să informați partenerul sau partenerii, deoarece o ITS netratată poate duce la complicații.



Harta locațiilor
de testare

COREVIH

Nouvelle-Aquitaine

COORDONNER ET AGIR ENSEMBLE
EN SANTÉ SEXUELLE

Mai multe informații
sunt disponibile la

www.corevih-na.fr

COREVIH Nouvelle-Aquitaine mulțumește sincer asociației Objectif Sida Zéro - Nice Alpes-Maritimes pentru permisiunea amabilă de a folosi conținutul broșurii sale, pe care ne-am bazat în mare măsură.