MOLECULE	PRIX TTC du TTT MENSUEL	SPECIALITE Présentation	POSOLOGIES ADULTES MODALITES DE PRISE JOURNALIERE	PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES	PRINCIPAUX ELEMENTS A SURVEILLER	ECRASABLE ALTERNATIVE
ASSOCIATIONS STR (SINGLE TABLET REGIMEN)						
FTC + TDF + EFV	225,35 €	EMTRICITABINE/ TENOFIVIR/EFVIRENZ cp 200/245/600mg	0-0-1 2h après le repas (au coucher)	Cf. EMTRIVA®/VIREAD®/SUSTIVA®		Ecrasable Efavirenz écrasable, TDF écrasable, Emtricitabine granulés
FTC + TDF + RPV	418,59 €	EVIPLERA® cp 200/245/25mg	1 cp/j Au cours du repas	Cf. EMTRIVA®/VIREAD®/EDURANT®		Non écrasable TDF écrasable, Emtricitabine granulés, monitoring C plasmatique +/- doubler dose Rilpivirine
FTC + TAF + RPV	435,50 €	ODEFSEY® cp 200/25/25mg	1 cp/j Au cours du repas	Cf. EMTRIVA®/EDURANT® Contre-indiqué si cl. Créat ≤ 30ml/mn	Cf. EMTRIVA®/EDURANT®	Ecrasable monitoring C plasmatique +/- doubler dose de Rilpivirine
3TC + TDF + DOR	407,43 €	DELSTRIGO® cp 300/245/100mg	1 cp/j Sans contrainte alimentaire	Cf. EPIVIR®/VIREAD®/PIFELTRO®	Cf. EPIVIR®/VIREAD®/PIFELTRO®	Pas d'information disponible
ABC + 3TC + DTG	634,03 € (cp 600mg)	TRIUMEQ® cp 600/300/50mg cp 60/30/5mg	1 cp/j Sans contrainte alimentaire Test HLA B5701 : test + : contre-indication test - : indication (97% des patients)	Cf. KIVEXA®/TIVICAY®	Cf. KIVEXA®/TIVICAY®	Ecrasable Abacavir et EPIVIR® sol buv, TIVICAY® cp dispersible (/! Bd x1,6)
FTC + TAF (ténofovir alafénamide) + EVG/Cobi	591,27 €	GENVOYA®** cp 200/10/150/150mg	1 cp/j Au cours du repas	Cf. EMTRIVA® Troubles digestifs, Troubles psychiatriques, Eruption cutanée, Céphalées ↗ créatininémie de 10µmol/l Contre-indiqué si cl. Créat ≤ 30ml/mn	Cf. EMTRIVA®	Ecrasable
FTC + TAF + BIC	625,57 €	BIKTARVY® cp 200/25/50mg cp 120/15/30mg	1 cp/j Sans contrainte alimentaire	Cf. EMTRIVA® Troubles digestifs, Troubles neuropsychiques Augmentation transitoire de la créatininémie Contre-indiqué si cl. Créat ≤ 30ml/mn	Cf. EMTRIVA®	Dispersible dans l'eau possible avec un dosage plasmatique du bictégravir et du ténofovir en cas d'administration prolongée
RPV + DTG	577,65 €	JULUCA® cp 50/25mg	1 cp/j Au cours du repas	Cf. TIVICAY®/EDURANT®		Ecrasable monitoring C plasmatique +/- doubler dose Rilpivirine
3TC + DTG	568,85 €	DOVATO® cp 300/50mg	1 cp/j Sans contrainte alimentaire	Cf. EPIVIR®/TIVICAY®		EPIVIR® sol buv, TIVICAY® cp dispersible (/! Bd x1,6)
INHIBITEURS NUCLEOSIDIQUES ET NUCLEOTIDIQUES DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE (INTI)						
3TC (Lamivudine)	63,81 € (cp)	EPIVIR® cp 150, 300mg sol buv 10mg/ml	300 mg/j en monoprise Sans contrainte alimentaire	Troubles musculo-squelettiques, Pancréatite, Acidose lactique, ↗ Transaminases, Céphalées, Insomnies	Amylase, Lipase, Transaminases, Signes d'acidose lactique, CPK !!! Si co-infection VHB : risque d'hépatite aiguë à l'arrêt du traitement	Ecrasable Préférer EPIVIR® sol buv
	63,81€ (cp 150 et 300mg)	LAMIVUDINE cp 100, 150, 300mg				
FTC (Emtricitabine)	153,06 € (gél)	EMTRIVA® gél 200mg sol buv 10mg/ml	1 gél/j Sans contrainte alimentaire	Troubles musculo-squelettiques, Pancréatite, Acidose lactique, ↗ Transaminases, Céphalées, Insomnies	Amylase, Lipase, Transaminases, Signes d'acidose lactique, CPK !!! Si co-infection VHB : risque d'hépatite aiguë à l'arrêt du traitement	Ouvrable Préférer la sol buv
TDF (Ténofovir Disoproxil)	128,00 €	VIREAD® cp 245mg	1 cp/j Au cours du repas	Néphrotoxicité (Sd de Fanconi): TTT contre indiqué si cl. Créat ≤ 60ml/mn Hypophosphatémie, Troubles digestifs	Créatininémie, Phosphatémie Glycosurie, Protéinurie Avant ttt puis tous les mois	Dispersible dans de l'eau ou du jus d'orange possible
	128,00 €	TENOFOVIR cp 245mg				
TDF + FTC	296,37 €	TRUVADA® cp 245/200mg	1 cp/j Au cours du repas	Cf. VIREAD®/EMTRIVA®		Ecrasable TDF écrasable et Emtricitabine granulés
	155,42 €	TENOFOVIR/EMTRICITABINE cp 245/200mg				
ABC (Abacavir)	149,88 € (cp)	ZIAGEN® cp 300 mg sol buv 20mg/ml	2 cp/j en mono ou biprise Sans contrainte alimentaire Association au TDF non recommandée (☐ efficacité viro) Test HLA B5701 : - test + : contre-indication - test - : indication (97% des patients)	Réactions d'hypersensibilité avec ou sans éruption cutanée : Fièvre, Troubles digestifs, respiratoires, musculaires, articulaires, Céphalées	Surveillance +++ les 6 1ères semaines de ttt, consultation tous les 15 jours Ne pas réintroduire si suspicion d'hypersensibilité +++	Ecrasable Préférer ZIAGEN® sol buv
	104,95 €	ABACAVIR cp 300 mg				
ABC + 3TC	174,24 €	KIVEXA® cp 600/300 mg	1 cp/j Sans contrainte alimentaire Test HLA B5701 (cf. ZIAGEN®)	Cf. ZIAGEN®/EPIVIR®		Non écrasable ZIAGEN® sol buv et EPIVIR® sol buv
	134,42 €	ABACAVIR/LAMIVUDINE cp 600/300 mg				
3TC + AZT	132,26 €	COMBIVIR® cp 300/150 mg	1-0-1 Sans contrainte alimentaire	Cf. EPIVIR®/RETROVIR®		Dispersible dans de l'eau ou du jus d'orange possible
	132,26 €	LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE cp 300/150 mg				

Génériques actuellement disponibles

MOLECULE	PRIX TTC du TTT Mensuel	SPECIALITE Présentation	POSOLOGIES ADULTES MODALITES DE PRISE JOURNALIERE	PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES	PRINCIPAUX ELEMENTS A SURVEILLER	ECRASABLE ALTERNATIVE
INHIBITEURS DE LA PROTEASE (IP)						
DRV (Darunavir)	462,57 € (cp 600mg) 289,14 € (cp 800mg)	PREZISTA® cp 75, 150, 400, 600, 800mg susp buvable 100mg/ml	1-0-0 (800mg) + RTV 1-0-0 naïfs ou prétraités sans mutation 1-0-1 (600mg) + RTV 1-0-1 prétraités avec mutation Au cours du repas	Troubles digestifs, Dyslipidémies, Diabète, Eruption cutanée, Lipodystrophies	Glycémie, Bilan lipidique, Bilan hépatique	Ecrasable Préférer PREZISTA® susp buv
	256,03 € (cp 600mg) 160,24 € (cp 800mg)	DARUNAVIR 400, 600, 800mg				
ATV (Atazanavir)	289,13 €	REYATAZ® gél 200, 300mg	1 gel/j 300mg + 1 RTV 2 gel/j 200mg + 1 RTV si EFV associé Au cours du repas	Troubles digestifs, Céphalées, Insomnie, Ictère scléral, Eruption cutanée, Lipodystrophies, Dyslipidémies, Lithiase rénale	Glycémie, Bilan hépatique, Bilirubine, Bilan lipidique, CPK, ECG	Ouvrable
	160,22 €	ATAZANAVIR gél 150, 200, 300mg				
LPV / RTV (Lopinavir Ritonavir)	221,11 € (cp 200mg)	KALETRA® cp 200/50mg cp 100/25mg sol buv 80/20mg/ml	4cp/j en mono ou biprise Au cours du repas	Troubles digestifs, Dyslipidémies, Diabète, Céphalées, Somnolence, Lipodystrophies, Allongement du QT	Glycémie, Transaminases, Bilan lipidique, ECG	Non écrasable KALETRA® sol buv
	165,07 € (cp 200mg)	LOPINAVIR/RITONAVIR cp 200/50mg cp 100/25mg				
BOOSTER						
RTV (Ritonavir)	17,79 € (cp)	NORVIR® cp 100mg sol buv 80mg/ml	1 à 2 cp/j Au cours du repas	Troubles digestifs, Paresthésies, Dyslipidémies, Lipodystrophies, Troubles hépatiques	Glycémie, NFS, CPK, Bilan lipidique, Transaminases	Non écrasable NORVIR® sol buv
	9,11 €	RITONAVIR cp 100mg				
INHIBITEURS NON-NUCLEOSIDIQUES DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE (INNTI)						
NVP (Névirapine)	100,39 € (cp 200mg) 91,13 € (cp 400mg)	VIRAMUNE® cp 200 mg cp LP 400mg susp buv 50mg/ml	200mg/j les 15 premiers jours, puis 400mg/j en monoprise Sans contrainte alimentaire	Anomalies hépatiques Toxidermie parfois sévère (Lyell)	Transaminases Surveillance +++ les 6 1ères semaines de ttt, consultation tous les 15 jours Non-recommandé si CD4 > 400/mm3 chez les hommes et > 250/mm3 chez les femmes en raison d'une majoration du risque d'hépatotoxicité	Forme LP : non écrasable Forme LI : écrasable ou VIRAMUNE® susp buv
	100,39 € (cp 200mg) 41,09 € (cp 400mg)	NEVIRAPINE cp 200 mg cp LP 400mg				
EFV (Efavirenz)	113,60 €	EFAVIRENZ cp 600mg	600 mg/j en une prise Au coucher (au moins 2 heures après le repas)	Troubles neuropsychiatriques Anomalies hépatiques Eruptions cutanées Lipodystrophies, Dyslipidémies	Transaminases Glycémie, TG, Cholestérol Contre-indiqué chez la femme enceinte pendant le 1er trimestre	Ecrasable
ETV (Etravirine)	234,72 € (cp 200mg)	INTELENCE® cp 25, 100, 200mg	400mg/j en mono ou biprise Après le repas	Eruption cutanée	Surveillance de la toxicité cutanée	Ecrasable et dispersible dans un verre d'eau
RPV (Ralpivirine)	203,73 €	EDURANT® cp 25 mg	1cp/j Au cours du repas	Céphalées, Troubles digestifs	Bilan lipidique et hépatique	Non écrasable
	349,46 € (prix de l'injection)	REKAMBYS® susp injectable LP 900 mg	Installation hospitalière : M1/M2/M4 puis administration tous les 2 mois en ville ou à l'hôpital Injection IM selon la technique en Z Conservation au réfrigérateur	Douleur et réaction au point d'injection, Céphalées, Fièvre	Bilan lipidique et hépatique, NFS, amylase, Lipase	NA
DOR (Doravirine)	217,09 €	PIFELTRO® cp 100 mg	1cp/j Sans contrainte alimentaire	Troubles neuropsychiatriques, Troubles digestifs, Rash, Asthénie, ↑ ALAT	Transaminases	Pas d'information disponible
INHIBITEURS D'INTEGRASE (INI)						
RAL (Raltegravir)	439,93 € (cp 400 et 600mg)	ISENTRESS® cp 400, 600mg cp à croquer 25 ou 100mg susp buvable 10mg/ml	1-0-1 pour les cp à 400mg 2cp/j pour les cp à 600mg Sans contrainte alimentaire	Troubles digestifs, Vertiges, Troubles psychiatriques, Rhabdomyolyse, Réactions d'hypersensibilité, Eruption cutanée Hyperhidrose	Transaminases CPK Signes d'hypersensibilité	Non écrasable ISENTRESS® susp buvable (non bioéquivalent)
DTG (Dolutégravir)	469,52 € (cp 50mg)	TIVICAY® cp 5, 50 mg	1-0-0 (50 mg) patients sans résistance à la classe des II et sans contrainte alimentaire 1-0-1 (50 mg) patients avec résistance à la classe des II et patients sans résistance mais associés aux inducteurs enzymatiques puissants à prendre au cours des repas	Troubles digestifs, Insomnies, Céphalées, Réaction d'hypersensibilité, Eruption cutanée, Augmentation transitoire de la créatininémie	Transaminases CPK Signes d'hypersensibilité Contre-indiqué chez la femme en désir de grossesse ou enceinte (1^{er} trimestre)	TIVICAY® cp dispersible (/! Bd x1,6)
CBG (Cabotégravir)	424,59 € (cp) 828,75 € (prix de l'injection)	VOCABRIA® cp 30 mg susp injectable LP 600 mg	Installation orale facultative pendant 28 j avant la 1ère inj: 1cp/j à prendre avec le cp d'EDURANT® Sans contrainte alimentaire Installation hospitalière : M1/M2/M4 puis administration tous les 2 mois en ville ou à l'hôpital Injection IM selon la technique en Z	Douleur et réaction au point d'injection, Céphalées, Fièvre, Troubles neuro psychiatrique, Troubles digestifs	Bilan hépatique	Pas d'information disponible
INHIBITEURS D'ENTREE						
MVC (Maraviroc)	472,25 € (cp)	CELSENTRI® cp 150, 300mg sol buv 20mg/ml	1-0-1 (150 mg) si IP/r (≠ TPV,FPV) 2-0-2 (300 mg) si EFV sans IP 1-0-1 (300 mg) si autres ARV Sans contrainte alimentaire Détermination préalable du tropisme de la souche virale pour le co-récepteur CCR5	Troubles digestifs Céphalées	Transaminases NFS	Ecrasable Préférer CELSENTRI® sol buv
FTR (Fostemsavir)	3 387,32 €	RUKOBIATM cp LP 600mg	1-0-1 Sans contrainte alimentaire	Diarrhées, Céphalées	Transaminases, CPK, Créatinine, Bilirubine directe	Pas d'information disponible
INHIBITEUR DE CAPSIDE						
LEN (Lénacavir)	3 107,06 € (5 cp) 21 130,77 € (prix de l'injection (2 flacons))	SUNLENCA® cp 300 mg sol inj 464 mg/1,5ml	J1 et J2 : 600 mg (2 cp), J8 : 300 mg (1 cp) Sans contrainte alimentaire J15: 927 mg (injection 2 x 1,5 ml) puis toutes les 26 semaines (+/- 2 semaines) : 927 mg (injection 2 x 1,5 ml)	Nausées Réaction au site d'injection (forme injectable)	Bilan hépatique et rénale	Non écrasable