

TRAITEMENT POST- EXPOSITION TOUDES LES INFORMATIONS DONT VOUS AVEZ BESOIN

Vous avez été exposé·e à un risque de transmission du virus VIH (SIDA), et/ou des hépatites. Le médecin des urgences a évalué l'importance du risque encouru selon le type d'exposition et l'existence de facteurs aggravants. En fonction de ces critères, il vous a prescrit un traitement, celui-ci ne se justifiant que pour le VIH dans de telles circonstances.

CoReSS
Nouvelle-Aquitaine

COORDONNER ET AGIR ENSEMBLE
EN SANTÉ SEXUELLE



Dans les 24 à 48 heures vous devez contacter l'équipe soignante de votre Centre Hospitalier pour être vu par un médecin référent VIH.

PRENEZ RENDEZ VOUS DÈS QUE POSSIBLE
avec le médecin référent VIH du service de maladies infectieuses de votre centre hospitalier.

POUR TOUTE LA DURÉE DU SUIVI ET PAR MESURE DE PRUDENCE, NOUS VOUS RECOMMANDONS :



D' UTILISER
UN PRÉSERVATIF
LORS DES
RAPPORTS
SEXUELS



DE NE
PAS FAIRE
UN DON DU SANG,
DE PLASMA, DE
PLAQUETTES.



D' ÉVITER
DE DÉBUTER
UNE GROSSESSE
OU D' ALLAITER



LE TRAITEMENT POST-EXPOSITION

Il s'agit d'un médicament ayant pour but d'éviter une éventuelle contamination par le VIH. Son efficacité permet d'éviter la transmission du VIH mais elle dépend aussi fortement de **la régularité de la prise du traitement.**



MON TRAITEMENT POST EXPOSITION

**2 comprimés par jour
pendant 28 jours**
à heure régulière
au milieu d'un repas



**1 TRUVADA générique
(TENOFOVIR DISOPROXIL,
FUMARATE, EMTRICITABINE)**



1 PIFELTRO® (DORAVIRINE)

OU

**1 comprimé par jour
pendant 28 jours**
à heure régulière
au milieu d'un repas



**1 DELSTRIGO
(DORAVIRINE, LAMIVUDINE,
TENOFOVIR DISOPROXIL
FUMARATE)**

Des effets indésirables sont possibles mais peu fréquents : nausées, vomissements, maux de tête, insomnie, vertiges. Ces effets diminuent au bout de quelques jours, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à joindre votre médecin traitant. **N'arrêtez en aucun cas votre traitement de vous-même.**

■ Si vous avez des vomissements

Si vous avez pris des médicaments moins d'une heure avant, ils ne seront pas absorbés : reprenez une dose.

■ Si vous avez oublié une prise

Si vous avez moins de 12 heures de retard, prenez simplement la dose oubliée dès maintenant, et la prochaine prise à l'heure habituelle.

S'il y a plus de 12 heures de retard sur l'horaire prévu, attendez la prochaine prise et ne prenez pas de double dose.

■ Si vous prenez un traitement associé

Si vous prenez d'autres traitements, informez votre médecin et votre pharmacien.



PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS QUE POSSIBLE AVEC LE MÉDECIN RÉFÉRENT VIH DU SERVICE DE MALADIES INFECTIEUSES DE VOTRE CENTRE HOSPITALIER.

COORDONNÉES DU SERVICE DE MALADIES INFECTIEUSES

A remplir par le médecin du service des Urgences