

MOLECULE	PRIX TTC du TTT MENSUEL	SPECIALITE Présentation	POSOLOGIES ADULTES MODALITES DE PRISE JOURNALIERE	PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES	PRINCIPAUX ELEMENTS A SURVEILLER
ASSOCIATIONS STR (SINGLE TABLET REGIMEN)					
FTC + TDF + EFV	528,47 €	ATRIPLA® cp 200/245/600mg	0-0-1 2h après le repas (au coucher)		Cf. EMTRIVA®/VIREAD®/SUSTIVA®
	225,35 €	EMTRICITABINE/ TENOFIVIR/ EFAVIRENZ cp 200/245/600mg			
FTC + TDF + RPV	492,24 €	EVIPLERA® cp 200/245/25mg	1 cp/j Au cours du repas		Cf. EMTRIVA®/VIREAD®/EDURANT®
FTC + TAF + RPV	448,93 €	ODEFSEY® cp 200/25/25mg	1 cp/j Au cours du repas	Cf. EMTRIVA®/EDURANT® Contre-indiqué si cl. Créat ≤ 30ml/mn	Cf. EMTRIVA®/EDURANT®
3TC + TDF + DOR	442,76 €	DELSTRIGO® cp 300/245/100mg	1 cp/j Sans contrainte alimentaire	Cf. EPIVIR®/VIREAD®/PIFELTRO®	Cf. EPIVIR®/VIREAD®/PIFELTRO®
ABC + 3TC + DTG	634,03 €	TRIUMEQ® cp 600/300/50mg	1 cp/j Sans contrainte alimentaire Test HLA B5701 : - test + : contre-indication - test - : indication (97% des patients)	Cf. KIVEXA®/TIVICAY®	Cf. KIVEXA®/TIVICAY®
FTC + TAF (ténofovir alafénamide) + EVG/Cobi	653,14 €	GENVOYA® cp 200/10/150/150mg	1 cp/j Au cours du repas	Cf. EMTRIVA® Troubles digestifs, Troubles psychiatriques, Eruption cutanée, Céphalées, ↗ créatininémie de 10µmol/l Contre-indiqué si cl. Créat ≤ 30ml/mn	Cf. EMTRIVA®
FTC + TAF + BIC	656,68 €	BIKTARVY® cp 200/25/50mg	1 cp/j Sans contrainte alimentaire	Cf. EMTRIVA® Troubles digestifs, Troubles neuropsychiques Augmentation transitoire de la créatininémie Contre-indiqué si cl. Créat ≤ 30ml/mn	Cf. EMTRIVA®
RPV + DTG	638,02 €	JULUCA® cp 50/25mg	1 cp/j Au cours du repas	Cf. TIVICAY®/EDURANT®	
3TC + DTG	609,08 €	DOVATO® cp 300/50mg	1 cp/j Sans contrainte alimentaire	Cf. EPIVIR®/TIVICAY®	

INHIBITEURS NUCLEOSIDIQUES ET NUCLEOTIDIQUES DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE (INTI)

3TC (Lamivudine)	63,81 € (cp)	EPIVIR® cp 150, 300mg sol buv 10mg/ml	300 mg/j en monoprise Sans contrainte alimentaire	Troubles musculo-squelettiques, Pancréatite, Acidose lactique, ↗ Transaminases, Céphalées, Insomnies	Amylase, Lipase, Transaminases, Signes d'acidose lactique, CPK !!! Si co-infection VHB : risque d'hépatite aiguë à l'arrêt du traitement
	63,81 € (cp 150 et 300mg)	LAMIVUDINE cp 100, 150, 300mg			
FTC (Emtricitabine)	153,06 € (gél)	EMTRIVA® gél 200mg sol buv 10mg/ml	1 gél/j Sans contrainte alimentaire	Troubles musculo-squelettiques, Pancréatite, Acidose lactique, ↗ Transaminases, Céphalées, Insomnies	Amylase, Lipase, Transaminases, Signes d'acidose lactique, CPK !!! Si co-infection VHB : risque d'hépatite aiguë à l'arrêt du traitement
TDF (Ténofovir Disoproxil)	128,00 €	VIREAD® cp 245mg	1 cp/j Au cours du repas	Néphrotoxicité (Sd de Fanconi): TTT contre indiqué si cl. Créat ≤ 60ml/mn Hypophosphatémie, Troubles digestifs	Créatininémie, Phosphatémie Glycosurie, Protéinurie Avant ttt puis tous les mois
	128,00 €	TENOFIVIR cp 245mg			
TDF + FTC	296,37 €	TRUVADA® cp 245/200mg	1 cp/j Au cours du repas		Cf. VIREAD®/EMTRIVA®
	155,42 €	TENOFIVIR/EMTRICITABINE cp 245/200mg			
ABC (Abacavir)	149,88 € (cp)	ZIAGEN® cp 300mg sol buv 20mg/ml	2 cp/j en mono ou biprise Sans contrainte alimentaire Association au TDF non recommandée (↘ efficacité viro) Test HLA B5701 : - test + : contre-indication - test - : indication (97% des patients)	Réactions d'hypersensibilité avec ou sans éruption cutanée : Fièvre, Troubles digestifs, respiratoires, musculaires, articulaires, Céphalées	Surveillance +++ les 6 1ères semaines de ttt, consultation tous les 15 jours Ne pas réintroduire si suspicion d'hypersensibilité +++
	104,95 €	ABACAVIR cp 300mg			
ABC + 3TC	174,24 €	KIVEXA® cp 600/300mg	1 cp/j Sans contrainte alimentaire Test HLA B5701 (cf. ZIAGEN®)		Cf. ZIAGEN®/EPIVIR®
	134,42 €	ABACAVIR/LAMIVUDINE cp 600/300mg			
3TC + AZT	132,26 €	COMBIVIR® cp 300/150mg	1-0-1 Sans contrainte alimentaire		Cf. EPIVIR®/RETROVIR®
	132,26 €	LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE cp 300/150mg			

Génériques actuellement disponibles



Mise à jour: Février 2023

Thérapeutiques antirétrovirales chez l'adulte

Modalités de prise

Effets indésirables

Surveillance biologique

MOLECULE	PRIX TTC du TTT MENSUEL	SPECIALITE Présentation	POSOLOGIES ADULTES MODALITES DE PRISE JOURNALIERE	PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES	PRINCIPAUX ELEMENTS A SURVEILLER
INHIBITEURS DE LA PROTEASE (IP)					
DRV (Darunavir)	462,57 € (cp 600mg) 289,14 € (cp 800mg)	PREZISTA® cp 75, 150, 400, 600, 800mg susp buvable 100mg/ml	1-0-0 (800mg) + RTV 1-0-0 naïfs ou prétraités sans mutation 1-0-1 (600mg) + RTV 1-0-1 prétraités avec mutation Au cours du repas	Troubles digestifs, Dyslipidémies, Diabète, Eruption cutanée, Lipodystrophies	Glycémie, Bilan lipidique, Bilan hépatique
	256,03 € (cp 600mg) 160,24 € (cp 800mg)	DARUNAVIR cp 75, 150, 400, 600, 800mg			
ATV (Atazanavir)	289,13 €	REYATAZ® gél 150, 200, 300mg	1 gel/j 300mg + 1 RTV 2 gel/j 200mg + 1 RTV si EFV associé Au cours du repas	Troubles digestifs, Céphalées, Insomnie, Ictère scléral, Eruption cutanée, Lipodystrophies, Dyslipidémies, Lithiase rénale	Glycémie, Bilan hépatique, Bilirubine, Bilan lipidique, CPK, ECG
	160,22 €	ATAZANAVIR gél 150, 200, 300mg			
LPV / RTV (Lopinavir Ritonavir)	304,64 € (cp 200mg)	KALETRA® cp 200/50mg cp 100/25mg sol buv 80/20ma/ml	4cp/j en mono ou biprise Au cours du repas	Troubles digestifs, Dyslipidémies, Diabète, Céphalées, Somnolence, Lipodystrophies, Allongement du QT	Glycémie, Transaminases, Bilan lipidique, ECG
	168,80 € (cp 200mg)	LOPINAVIR/RITONAVIR cp 200/50mg			
BOOSTER					
RTV (Ritonavir)	17,79 € (cp)	NORVIR® cp 100mg sol buv 80mg/ml	1 à 2 cp/j Au cours du repas	Troubles digestifs, Paresthésies, Dyslipidémies, Lipodystrophies, Troubles hépatiques	Glycémie, NFS, CPK, Bilan lipidique, Transaminases
	9,11 €	RITONAVIR cp 100mg			
INHIBITEURS NON-NUCLEOSIDIQUES DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE (INNTI)					
NVP (Névirapine)	100,39 € (cp 200mg) 91,13 € (cp 400mg)	VIRAMUNE® cp 200mg cp LP 400mg susp buv 50mg/ml	200mg/j les 15 premiers jours, puis 400mg/j en monoprise Sans contrainte alimentaire	Anomalies hépatiques Toxidermie parfois sévère (Lyell)	Transaminases Surveillance +++ les 6 1ères semaines de ttt, consultation tous les 15 jours Non-recommandé si CD4 > 400/mm3 chez les hommes et > 250/mm3 chez les femmes en raison d'une majoration du risque d'hépatotoxicité
	100,39 € (cp 200mg) 41,09 € (cp 400mg)	NEVIRAPINE cp 200mg cp LP 400mg			
EFV (Éfavirenz)	113,60 € (cp)	SUSTIVA® gél 50, 100, 200mg cp 600mg sol buv 30mg/ml	600 mg/j en une prise Au coucher (au moins 2 heures après le repas)	Troubles neuropsychiatriques Anomalies hépatiques Eruptions cutanées Lipodystrophies, Dyslipidémies	Transaminases Glycémie, TG, Cholestérol Contre-indiqué chez la femme enceinte pendant le 1er trimestre
	113,60 €	ÉFAVIRENZ cp 600mg			
ETV (Etravirine)	293,11 € (cp 200mg)	INTELENCE® cp 25, 100, 200mg	400mg/j en mono ou biprise Après le repas (dispersible dans un verre d'eau)	Eruption cutanée	Surveillance de la toxicité cutanée
RPV (Rilpivirine)	226,23 €	EDURANT® cp 25mg	1cp/j au cours du repas Instauration orale facultative pendant 28 j avant la 1ère injection de REKAMBYS®	Céphalées, Troubles digestifs	Bilan lipidique, Bilan hépatique
	381,00 €	REKAMBYS® susp injectable LP 900mg	Instauration hospitalière : M1/M2/M4 puis administration tous les 2 mois en ville ou à l'hôpital Injection IM selon la technique en Z Conservation au réfrigérateur	Douleur et réaction au point d'injection, Céphalées, Fièvre	Bilan lipidique, bilan hépatique, NFS, Amylase, Lipase
DOR (Doravirine)	226,08 €	PIFELTRO® cp 100mg	1cp/j Sans contrainte alimentaire	Troubles neuropsychiatriques, Troubles digestifs, Rash, Asthénie, ↗ ALAT	Transaminases
INHIBITEUR D'INTEGRASE (II)					
RAL (Raltégravir)	488,69 € (cp 400 et 600mg)	ISENTRESS® cp 400, 600mg cp à croquer 25 ou 100mg susp buvable 20mg/ml	1-0-1 pour les cp à 400mg 2cp/j pour les cp à 600mg Sans contrainte alimentaire	Troubles digestifs, Vertiges, Troubles psychiatriques, Rhabdomyolyse, Réactions d'hypersensibilité, Eruption cutanée Hyperhidrose	Transaminases CPK Signes d'hypersensibilité
DTG (Dolutégravir)	521,55 (cp 50mg)	TIVICAY® cp 10, 30, 50mg	1-0-0 (50 mg) patients sans résistance à la classe des II et sans contrainte alimentaire 1-0-1 (50 mg) patients avec résistance à la classe des II et patients sans résistance mais associés aux inducteurs enzymatiques puissants à prendre au cours des repas	Troubles digestifs, Insomnies, Céphalées, Réaction d'hypersensibilité, Eruption cutanée, Augmentation transitoire de la créatininémie	Transaminases CPK Signes d'hypersensibilité Contre-indiqué chez la femme en désir de grossesse ou enceinte (1 ^{er} trimestre)
CAB (Cabotégravir)	462,98 € (cp) 900,79 € (susp inj)	VOCABRIA® cp 30mg susp injectable LP 600mg	Instauration orale facultative pendant 28 j avant la 1ère injection : 1cp/j à prendre avec le cp d'EDURANT® Instauration hospitalière : M1/M2/M4 puis administration tous les 2 mois en ville ou à l'hôpital Injection IM selon la technique en Z	Douleur et réaction au point d'injection Céphalées, Fièvre Troubles neuropsychiatriques Troubles digestifs	Bilan hépatique
INHIBITEURS D'ENTREE					
MVC (Maraviroc)	524,59 € (cp 150 et 300mg)	CELSENTRI® cp 25, 75, 150, 300mg sol buv 20mg/ml	1-0-1 (150 mg) si IP/r (≠ TPV,FPV) 2-0-2 (300 mg) si EFV sans IP 1-0-1 (300 mg) si autres ARV Sans contrainte alimentaire Détermination préalable du tropisme de la souche virale pour le co-récepteur CCR5	Troubles digestifs Céphalées	Transaminases NFS
FTR (Fostemsavir)	3 387,32 €	RUKOBIA® cp LP 600mg	1-0-1 Sans contrainte alimentaire	Diarrhées Céphalées	Transaminases, CPK, Créatinine, Bilirubine directe