

MOLÉCULE	Prix TTC du TTT mensuel	SPECIALITE Présentation	POSOLOGIES ADULTES ET MODALITES DE PRISE JOURNALIERE	PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES	PRINCIPAUX ELEMENTS A SURVEILLER
<b>INHIBITEURS DE LA PROTEASE (IP)**</b>					
<b>DRV</b> (Darunavir)	531.65€ (cp 600mg) 332.89€ (cp 800mg)	<b>PREZISTA®</b> cp 75, 150, 400, 600, 800mg susp buvable 100mg/ml	1-0-0 (800mg) + RTV 1-0-0 naïfs ou prétraités sans mutation 1-0-1 (600mg) + RTV 1-0-1 prétraités avec mutation <i>Au cours du repas</i>	Troubles digestifs, Dyslipidémies, Glycémie Eruption cutanée, Lipodystrophies	Glycémie, Bilan lipidique Bilan hépatique
	281.13€ (cp 600mg) 176.05€ (cp 800mg)	<b>DARUNAVIR</b> cp 75, 150, 400, 600, 800mg			
<b>ATV</b> (Atazanavir)	415.70€	<b>REYATAZ®</b> gél 150, 200, 300mg	1 gel/j 300mg + 1 RTV 2 gel/j 200mg + 1 RTV si EFV associé <i>En monoprise au cours du repas</i>	Troubles digestifs, Céphalées, Insomnie, Ictère scléral, Eruption cutanée, Lipodystrophies, Dyslipidémies, Lithiase rénale	Glycémie, Bilan hépatique Bilirubine, Bilan lipidique CPK, ECG
<b>LPV / RTV</b> (Lopinavir Ritonavir)	437.99€ (cp)	<b>KALETRA®</b> cp 200/50mg sol buv 80/20mg/ml	4cp/j en mono ou biprise <i>Au cours du repas</i>	Troubles digestifs, Dyslipidémies, transaminases, Glycémie, Céphalées, Somnolence, Lipodystrophies, Allongement du QT	Glycémie, Transaminases Bilan lipidique, ECG
<b>FPV</b> (Fos-amprénavir)	368.11€ (cp)	<b>TELZIR®</b> cp 700mg susp buv 50mg/ml	1-0-1 + RTV 1-0-1 <i>Au cours du repas (cp)</i> <i>A jeun (susp. buv.)</i>	Troubles digestifs, Eruption cutanée Lipodystrophies, Dyslipidémies	Glycémie, Transaminases Bilan hépatique Bilan lipidique
<b>BOOSTER</b>					
<b>RTV</b> (Ritonavir)	21.23€ (cp)	<b>NORVIR®</b> cp 100mg sol buv 80mg/ml	1 à 4 cp/j selon l'IP boosté <i>Au cours du repas</i>	Troubles digestifs, Paresthésies, Dyslipidémies, Lipodystrophies, Troubles hépatiques	Glycémie, NFS, CPK Bilan lipidique Transaminases
	10.79€	<b>RITONAVIR</b> cp 100mg			
<b>ASSOCIATIONS STR (SINGLE TABLET REGIMEN)</b>					
<b>FTC + TDF + EFV</b>	602.96€	<b>ATRIPLA®</b> cp 600/200/245 mg	0-0-1 <i>2h après le repas (au coucher)</i>	Cf. SUSTIVA® / EMTRIVA®/VIREAD®	
	263.62€	<b>EMTRICITABINE/ TENOFIVIR/ EFAVIRENZ</b> cp 600/200/245 mg			
<b>FTC + TDF + RPV</b>	621.24€	<b>EVIPLERA®</b> cp 200/25/245 mg	1 cp/j <i>Au cours du repas</i>	Cf. EMTRIVA®/EDURANT®/VIREAD®	
<b>FTC + TDF + EVG/Cobi</b>	877.45€	<b>STRIBILD®</b> cp 150/150/200/245 mg	1 cp/j <i>Au cours du repas</i>	Cf. VIREAD®/ EMTRIVA® Troubles psychiatriques, Eruption cutanée, Céphalées, ↗ créatininémie de 10µmol/l	Cf. VIREAD® / EMTRIVA®
<b>ABC + 3TC + DTG</b>	758.47€	<b>TRIUMEQ®</b> cp 50/600/300mg	1 cp/j <i>Sans contrainte alimentaire</i> <b>Test HLA B5701 :</b> - test + : contre-indication - test - : indication (97% des patients)	Cf. KIVEXA®/TIVICAY®	
<b>FTC + TAF (tenofovir alafénamide) + EVG/Cobi</b>	758.47€	<b>GENVOYA®</b> cp 150/150/200/10 mg	1 cp/j <i>Au cours du repas</i>	Cf. EMTRIVA® Troubles digestifs, Troubles psychiatriques, Eruption cutanée, Céphalées, ↗ créatininémie de 10µmol/l contre indiqué si cl. Créat ≤ 30ml/mn	Cf. EMTRIVA®
<b>FTC + TAF + RPV</b>	495.93€	<b>ODEFSEY®</b> cp 200/25/25 mg	1 cp/j <i>Au cours du repas</i>	Cf. EMTRIVA®/EDURANT® contre indiqué si cl. Créat ≤ 30ml/mn	Cf. EMTRIVA®/EDURANT®
<b>DTG + RPV</b>	730.33€	<b>JULUCA®</b> cp 50/25mg	1 cp/j <i>Au cours du repas</i>	Cf. TIVICAY®/EDURANT®	
<b>FTC + TAF + BIC</b>	730.33€	<b>BIKTARVY</b> cp 50/200/25 mg	1 cp/j <i>Sans contrainte alimentaire</i>	Cf. EMTRIVA® contre indiqué si cl. Créat ≤ 30ml/mn Troubles digestifs, Troubles neuropsychiques Augmentation transitoire de la créatininémie	Cf. EMTRIVA®

\*\* Attention aux interactions médicamenteuses

Génériques actuellement disponibles

**COREViH**  
Nouvelle Aquitaine

Mise à jour : Mars 2019

**Thérapeutiques antirétrovirales chez l'adulte**

**Modalités de prise  
Effets indésirables**

MOLÉCULE	Prix TTC du TTT mensuel	SPECIALITE <i>Présentation</i>	POSOLOGIES ADULTES ET MODALITES DE PRISE JOURNALIERE	PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES	PRINCIPAUX ELEMENTS A SURVEILLER
<b>INHIBITEURS NUCLEOSIDIQUES ET NUCLEOTIDIQUES DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE (INTI)</b>					
<b>3TC</b> <i>(Lamivudine)</i>	73.87€ (cp)	<b>EPIVIR®</b> cp 150, 300 mg sol buv 10mg/ml	300 mg/j en monoprise <b>Sans contrainte alimentaire</b>	Troubles musculo-squelettiques Pancréatite, Acidose lactique ↗ Transaminases, Céphalées, Insomnies	<b>Amylase, lipase, transaminases</b> <b>Signes d'acidose lactique, CPK</b> <b>!!! Si co-infection VHB : risque d'hépatite aiguë à l'arrêt du traitement</b>
	65.58€	<b>LAMIVUDINE</b> cp 150, 300 mg			
<b>FTC</b> <i>(Emtricitabine)</i>	154.57€ (cp)	<b>EMTRIVA®</b> gél 200 mg sol buv 10mg/ml	1 gé/lj <b>Sans contrainte alimentaire</b>	Troubles musculo-squelettiques Pancréatite, Acidose lactique ↗ Transaminases, Céphalées, Insomnies	<b>Amylase, lipase, transaminases</b> <b>Signes d'acidose lactique, CPK</b> <b>!!! Si co-infection VHB : risque d'hépatite aiguë à l'arrêt du traitement</b>
<b>TDF</b> <i>(Ténofovir)</i>	289.30€	<b>VIREAD®</b> cp 245 mg	1 cp/j <b>Au cours du repas</b>	Néphrotoxicité (Sd de Fanconi) : TTT contre indiqué si cl. Créat ≤ 70ml/mn Hypophosphatémie Troubles digestifs	<b>Créatininémie</b> <b>Phosphatémie</b> <b>Glycosurie Protéinurie</b> Avant ttt puis tous les mois
	137.96€	<b>TENOFOVIR</b> cp 245 mg			
<b>TDF + FTC</b>	341.21€	<b>TRUVADA®</b> cp 245/200 mg (dispersible dans un verre d'eau, de jus d'orange ou de raisin)	1 cp/j <b>Au cours du repas</b>		<i>Cf. VIREAD® / EMTRIVA®</i>
	170.97€	<b>TENOFOVIR/EMTRICITABINE</b> cp 245/200 mg			
<b>ABC</b> <i>(Abacavir)</i>	221.91€ (cp)	<b>ZIAGEN®</b> cp 300 mg sol buv 20mg/ml	2 cp/j en mono ou biprise <b>Sans contrainte alimentaire</b> Association au TDF non recommandée (↗ efficacité virologique) <b>Test HLA B5701 :</b> - test + : contre-indication - test - : indication (97% des patients)	Réactions d'hypersensibilité <b>avec</b> ou <b>sans</b> éruption cutanée : Fièvre, Troubles digestifs, respiratoires, musculaires, articulaires, Céphalées	<b>Surveillance +++ les 6 1ères semaines de ttt</b> , consultation tous les 15 jours <b>Ne pas réintroduire si suspicion d'hypersensibilité +++</b>
	117.61€	<b>ABACAVIR</b> cp 300 mg			
<b>ABC + 3TC</b>	286.02€	<b>KIVEXA®</b> cp 600/300 mg	1 cp/j <b>Sans contrainte alimentaire</b> Test HLA B5701 (cf. Ziagen®)		<i>Cf. ZIAGEN® / EPIVIR®</i>
	151.37€	<b>ABACAVIR/LAMIVUDINE</b> cp 600/300 mg			
<b>AZT + 3TC</b>	150.00€	<b>COMBIVIR®</b> cp 300/150 mg	1-0-1 <b>Sans contrainte alimentaire</b>		<i>Cf. RETROVIR® / EPIVIR®</i>
	139.10€	<b>LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE</b> cp 300/150 mg			
<b>INHIBITEURS NON-NUCLEOSIDIQUES DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE (INNTI) **</b>					
<b>NVP</b> <i>(Névirapine)</i>	107.35€ (cp 200mg)	<b>VIRAMUNE®</b> cp 200 mg cp LP 400mg susp buv 50mg/ml	200mg/j les 15 premiers jours, puis 400mg/j en monoprise, <b>Sans contrainte alimentaire</b>	Anomalies hépatiques Toxidermie parfois sévère (Lyell)	<b>Transaminases</b> <b>Surveillance +++ les 6 1ères semaines de ttt</b> , consultation tous les 15 jours  Non-recommandé si CD4 > 400/mm3 chez les hommes et > 250/mm3 chez les femmes en raison d'une majoration du risque d'hépatotoxicité
	102.38€ (cp 200mg)				
	45.84€ (cp 400mg)				
<b>EFV</b> <i>(Efavirenz)</i>	115.03€ (cp)	<b>SUSTIVA®</b> gél 50, 100, 200 mg cp 600 mg sol buv 30mg/ml	600 mg/j en une prise <b>Au coucher (au moins 2 heures après le repas)</b>	Troubles neuropsychiatriques Anomalies hépatiques Éruptions cutanées Lipodystrophies, Dyslipidémies	<b>Transaminases</b> Glycémie, TG, Cholestérol  Contre-indiqué chez la femme enceinte pendant le 1er trimestre
	115.03€	<b>EFAVIRENZ</b> cp 600mg			
<b>ETV</b> <i>(Etravirine)</i>	347.33€ (cp 200mg)	<b>INTELENCE®</b> cp 100, 200 mg (dispersible dans un verre d'eau)	400mg/j en mono ou biprise <b>Après le repas</b>	Eruption cutanée	<b>Surveillance de la toxicité cutanée</b>
<b>RPV</b> <i>(Rilpivirine)</i>	240.06€	<b>EDURANT®</b> cp 25 mg	1cp/j <b>Au cours du repas</b>	Peu fréquents : Céphalées, Troubles digestifs	Non spécifique Bilan <b>lipidique et hépatique</b>
<b>INHIBITEUR D'INTEGRASE (II)</b>					
<b>RAL</b> <i>(Raltégravir)</i>	551.02€ (cp 400 et 600mg)	<b>ISENRESS®</b> cp 400 mg cp 600 mg cp à croquer 25 ou 100mg susp buvable 20mg/ml	1-0-1 pour les cp à 400mg 2cp/j pour les cp à 600mg <b>Sans contrainte alimentaire</b>	Troubles digestifs, Vertiges, Troubles psychiatriques, Rhabdomyolyse Réactions d'hypersensibilité, Eruption cutanée Hyperhidrose	<b>Transaminases</b> CPK Signes d'hypersensibilité
<b>DTG</b> <i>(Dolutégravir)</i>	551.02€ (cp 50mg)	<b>TIVICAY®</b> cp 10, 30, 50 mg	1-0-0 (50 mg) patients sans résistance à la classe des II et <b>sans contrainte alimentaire</b> 1-0-1 (50 mg) patients avec résistance à la classe des II et patients sans résistance mais associés aux inducteurs enzymatiques puissants <b>à prendre au cours des repas</b>	Troubles digestifs, Insomnies, Céphalées Réaction d'hypersensibilité, Eruption cutanée Augmentation transitoire de la créatininémie	<b>Transaminases</b> CPK Signes d'hypersensibilité  Contre-indiqué chez la femme en désir de grossesse ou enceinte
<b>INHIBITEURS D'ENTREE</b>					
<b>MVC</b> <i>(Maraviroc)</i>	651.87€ (cp 150 et 300mg)	<b>CELSENTRI®</b> cp 25, 75, 150, 300mg sol buv 20mg/ml	1-0-1 (150 mg) si IP/r (≠ TPV,FPV) 2-0-2 (300 mg) si EFV sans IP 1-0-1 (300 mg) si autres ARV <b>Sans contrainte alimentaire</b> <b>Détermination préalable du tropisme de la souche virale pour le co-récepteur CCR5</b>	Troubles digestifs Céphalées	<b>Transaminases</b> NFS